LÍNEA FATRO-URIACH PARA INFECCIONES RESPIRATORIAS PORCINAS

		COMPOSICIÓN	DOSIS	PERÍODO DE SUPRESIÓN (CARNE)
TERAPIA SOLUBLE	 Doxidol 1 Kg y 5x100 gr	Doxiciclina (hiclato) 10 g Excipiente 100 g	Oral 5 días | 1 gr/10 kg PV	48 H
	 Eupensol 1 Kg	Amoxicilina (trihidrato) 70 g Excipiente c.s.p. 100 g	Oral 5 días | 0,143 gr/10 kg PV	14 DÍAS
	 Uriavit Bc Carnitina 1 Kg	Vit B1 10 g; Vit B2 4 g ; Vit B6 8 g ; Vit B12 20 mg ; Vit BT (CARNITINA) 30 g ; Pantonetato de calcio 25 mg ; Vit C 20 mg ; Ac fólico 10 g; Nicotinamida 50 g; Excipiente c.s.p. 1 kg	Oral 10-15 días | 0,5 – 1 gr/litro	NO PRECISA
TERAPIA INYECTABLE	 Lincostran 100 y 250 ml	Lincomicina clorhidrato 50 mg Espectinomicina sulfato 100 mg Bromhexina clorhidrato 2,5 mg Excipiente c.s.p 1 ml	I.M. 2-4 días | 1 –2 ml/10 kg PV	21 DÍAS
	 Fatroflox 100 y 250 ml	Enrofloxacino 100 mg Excipiente c.s.p 1 ml	S.C. 0,25-0,5 ml/10 kg PV	12 DÍAS
	 Cyclosol 200 L.A. 100 y 250 ml	Oxitetraciclina (clorhidrato) 200 mg Excipiente c.s.p 1 ml	I.M. dosis única | 1 ml/10 kg PV	22 DÍAS
	 Espiramicil 100 ml	Espiramicina (adipato) 600.000 UI/ml Excipiente c.s.p 1 ml	I.M. 2-3 días | 1,5 ml/10 kg PV	28 DÍAS
	 Fatromine100 ml	Flunixino (meglumina) 50 mg Fenol 5 mg Formaldehído sulfoxilato sódico 2,5 mg Excipiente c.s.p 1 ml	I.M. 2 ml/45kg PV	14 DÍAS
	 Deyanil Fuerte 10 y 50 ml	Dexametasona 2 mg Excipiente c.s.p 1 ml	I.M. dosis única | 0,2-0,8 ml/10 kg	4 DÍAS

FATROSPIRINA 600 mg

polvo oral. Composición: Ácido acetilsalicílico, 60 g; Excipiente, c.s.p. 100 g. Indicaciones: Tratamiento sintomático para reducir la pirexia moderada en el contexto de enfermedades infecciosas, en combinación con una terapia antiinfecciosa apropiada. Dosificación y modo de empleo: 35 mg de FATROSPIRINA por kg p.v. cada 12 h hasta remisión de la fiebre o un máximo de 5 días consecutivos (Dosificación por litro cada 12 h: 0,035 x Peso medio de los animales(kg)/Consumo medio cada 12h (litros)). Tiempo de espera: 1 día. Nº Reg: 1878 ESP

La solución más adecuada en manos del veterinario

Fatro Ibérica, S.L.
Constitución,1 | Planta Baja, 3
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel: 93 480 22 77 – Fax: 93 473 55 44
www.fatroiberica.es

FATROSPIRINA 600 mg


ácido acetilsalicílico micronizado en polvo oral

TSS TOTAL SOLUBILITY SYSTEM

FATROSPIRINA 600 mg

FATROSPIRINA *es un antiinflamatorio no esteroideo (aine) a base de ácido acetilsalicílico (aas) para el tratamiento de procesos febriles e inflamatorios en ganado porcino.*

FATROSPIRINA bloquea irreversiblemente la entrada del ac. araquidónico impidiendo la formación de los mediadores de la inflamación *(prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos).*



Para dar lugar a la inflamación el ácido araquidónico debe entrar en el interior de la ciclooxigenasa

Este bloqueo es el responsable de las principales indicaciones del AAS :

- ☑ Antipirético
- ☑ Antiinflamatorio
- ☑ Analgésico



"La tecnología TSS garantiza la estabilidad de la FATROSPIRINA durante más de 24 h, evitando la precipitación del producto en solución"

"FATROSPIRINA puede asociarse a otros productos antibióticos sin problemas de incompatibilidad"


TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN TSS TOTAL SOLUBILITY SYSTEM

- **Cristales micronizados <75 micron**
- **Agente salicante:** solubiliza **FATROSPIRINA** en agua.
- **Agente efervescente:** aumenta la dispersión del microcristal en agua.
- **Agente tensoactivo:** disminuye la formación de flóculos.
- **Agente tampón:** permite un balance adecuado del pH de la solución reduciendo la irritabilidad gástrica.

MÁXIMA BIODISPONIBILIDAD

***La biodisponibilidad** de **FATROSPIRINA** supera con amplitud el 90% de la dosis suministrada por vía oral, muy por encima del ac. acetilsalicílico no micronizado.*

DIFERENCIA DE ABSORCIÓN DE *FATROSPIRINA* FRENTE A LA MATERIA PRIMA (ac. acetilsalicílico) E INFLUENCIA SOBRE LA BIODISPONIBILIDAD.



MÁXIMA SOLUBILIDAD

***Solubilidad máxima** gracias a los agentes salicantes y efervescentes del excipiente.*

MÁXIMA SEGURIDAD

***Seguridad** frente a irritabilidad gástrica y úlceras gracias a su menor dosificación y al agente tampón de su excipiente.*

MÁXIMA EFICACIA

Estudios clínicos realizados con modelos experimentales de inducción de fiebre con LPS de E. coli, y confirmados posteriormente con pruebas de campo, demostraron la actividad antipirética de FATROSPIRINA, a la dosis de 42 mg de AAS/kg de PV.

(muy inferior a otros productos a base de acetilsalicílico)

"En medicina humana la dosis terapéutica recomendada del ácido acetilsalicílico es de 500 mg cada 4-6 horas, lo que equivale a entre 28,5 y 42,8 mg de ácido acetilsalicílico/kg PV al día"

RECOMENDACIONES DE USO

- ***Procesos febriles postvacunación,*** *característico de vacunas atenuadas y vacunas inactivadas con excipiente oleoso.*
- ***Estrés adaptativo,*** *en cambios de alojamiento y reagrupamientos, generalmente asociado al destete y el transporte.*
- ***Tratamiento de procesos infecciosos,*** *acompañando al tratamiento antibiótico en procesos bacterianos.*

Enfermedad	Temperatura
PPC agudo	> 41º C
PPC crónica	40º - 41º C
Mal rojo agudo	< 42º C
Mal rojo septicémico	39,5º - 40º C
Gripe porcina (influenza)	40º - 41º C
Actinobacillus pleuropneumoniae	< 41,5º C
Pasteurellosis	< 42,2º C

Fuentes: *Manual enfermedades del cerdo (Hans Plonait), Manual Enfermedades porcino (K.J Schwartz), Desease of Swine. Barbara E. Straw y Manual Merck*

- ***Estrés por calor en reproductoras.*** *La acción vasodilatadora periférica del AAS permite una mejor evacuación del calor.*
- ***Tratamiento sintomático en parideras,*** *durante los primeros días postparto.*



Peso medio	Consumo de agua cada 12 h.	Gramos de Fatrospirina por cada 1000 litros de agua
20 kg	0,5 litros	1.400
50 kg	2,5 litros	700
100 kg	5 litros	700
Cerdas gestantes	9 litros	900
Cerdas lactantes	15 litros	500

Dosificación:
35 x Peso medio (kg) / Consumo medio de agua cada 12 h (l) = gr de FATROSPIRINA/ 1000 litros de agua