
Lincomastina

Gel intramamario para vacas en lactación








750 mg de Lincomicina

- 1. La mayor concentración de Lincomicina en cánulas intramamarias
- 2. Excipiente: Hidrogel a base agua exclusivo de Fatro
- 3. Período de retirada en leche de 84 horas (3,5 días)
- 4. Elevada y duradera concentración en la ubre

Indicaciones

Lincomastina esta indicado para la terapia de la MASTITIS CLÍNICA actuando sobre microorganismos sensibles a la lincomicina:

- *Streptococcus uberis*
- *S. aureus* incluyendo cepas productoras de penicilasas
- *Estafilococos coagulasa* negativos CNS (como *Staphylococcus chromogenes* y *Staphylococcus epidermidis*)
- *Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae*



Lincomastina se caracteriza por la superposición casi completa entre la actividad terapéutica y los tiempos de espera en la leche.

Elevada y prolongada concentración en la ubre

Cada cánula de Lincomastina contiene 750 mg de lincomicina. Esto asegura concentraciones de principio activo en ubre y en la leche más altos que el MIC_{90} de los principales patógenos.

Las concentraciones después de 24 horas del último tratamiento (8,5 ± 3,8 µg/ml) son hasta 4 veces superiores mostrando la gran potencia del producto.

Patógeno	MIC_{90}
Staph. aureus	2 µg/ml
Strept. agalactiae	0,5 µg/ml
Strept. dysgalactiae	0,25 µg/ml
Strept. uberis	2 µg/ml
CNS	2 µg/ml

Zecconi, 2011

Como se observa, Lincomastina a las 24 horas del último tratamiento mantiene concentraciones superiores a 4 veces el MIC_{90} de los principales patógenos.

Vehículo especialmente diseñado para la ubre

- **Único y exclusivo vehículo en gel acuoso patentado por FATRO**
- **Rápida y completa disponibilidad del principio activo**
- **Perfecta tolerabilidad y respeto del parénquima mamario**
- **Eficacia terapéutica prolongada**
- **Tiempo de espera corto (3,5 días)**





Mira el vídeo de la prueba hecha con Lincomastina

goo.gl/Y0mEl8

La prueba de difusión de la Lincomastina mostró la difusión completa y homogénea tanto en agua como en la leche en comparación con otros productos en el mercado



LINCOMASTINA solución intramamaria. **Composición:** Una jeringa intramamaria de 5 g contiene: Lincomicina 750 mg. **Indicaciones de uso.** Tratamiento de las mastitis clínicas en el periodo de lactación, causadas por bacterias Gram-positivas sensibles a la lincomicina: *Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae* y *Streptococcus uberis*. **Contraindicaciones.** No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. **Tiempos de espera:** Carne: 3 días. Leche: 84 horas. **Excipientes:** Hipromelosa, Agua para preparaciones inyectables. **Nº registro:** 3132 ESP con receta veterinaria

La solución más adecuada en manos del veterinario

Fatro Ibérica • Constitución, 1 - PB 3 • 08960 Sant Just Desvern • Barcelona (ESPAÑA)
Tel.: 93 480 22 77 vet@fatroiberica.es www.fatroiberica.es